

## **MILKIWEAN FEEDER – Dé oplossing bij partieel spenen!** [1]

De combinatie van een ontoereikende melkproductie en hoge aantallen levend geboren biggen bij de hedendaagse zeugenlijnen leidt tot een verhoogd sterftepercentage van de biggen bij de zeug en/of grote uniformiteitsverschillen bij het spenen. De lichtste biggen vertonen vaak een heel lage voeropname na spenen. Dit ondermijnt niet alleen de weerstand, maar heeft ook een negatieve invloed op hun groei en de uniformiteit van de ganse toom na het spenen.

Een aangepast voerschema met *Porcy-SAVE* of *Porcy-START* en BABYMILK in combinatie met de *MILKIWEAN FEEDER*, biedt u dé oplossing om heel jonge en lichte biggen (vanaf 3 kg) moederloos op te fokken.



### **VOORDELEN MILKIWEAN FEEDER:**

- Kleine porties, vers voer
- Regelmatige voeropname
- Minder voervermorsing
- Warme brij!
- Opvang 25 tot 30 biggen
- Overal makkelijk inzetbaar

### **Aanbevolen tijdschema**

Dag 1: 10 min/uur  
 Dag 2: 10 min/uur  
 Dag 3: 15 min/uur  
 Dag 4: 20 min/uur  
 Dag 5: 25 min/uur  
 Dag 6: 30 min/uur

Door het verstrekken van kleine porties brij met regelmatige intervallen, wordt het natuurlijk zooggedrag nagebootst. Dit vermijdt overbelasting van het spijsverteringskanaal en garandeert een goede ontwikkeling van het maagdarmsstelsel, met een duidelijk positief effect op het gewicht van de biggen.

### **Opgelet:**

1. Zorg dat geen restvoer in de trog staat bij het starten van de volgende voederbeurt. Pas indien nodig de voedertijd aan.
2. Voorzie telkens droogvoer voor 1 dag, zodat de versheid wordt gegarandeerd. Vanaf dag 6 wordt de voedertijd niet meer verhoogd, zodat de opname van droogvoer wordt gestimuleerd. Zo zijn de biggen optimaal voorbereid op de overgang naar speenvoer.



### **Voerschema voor biggen tot 21 dagen ouderdom:**

Babymilk in Milkiwean Feeder gecombineerd met *Porcy-START* of *Porcy-SAFE* als droogvoer

**Voer:** Via de watertoevoer kan u de dikte van de brij bepalen.